AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-8-920143 9 ®

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -
☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 13
du 21 AOUT 1992

VIGNE

* Tordeuses de la grappe

Capture importante de papillons aux alentours du 15 août.

A ce stade de matûrité des raisins,

1°) Vendanges imminentes pour les cépages précoces tel Chardonnay,

2°) Vendanges plus tardives pour les autres,

Il convient d'éviter les morsures et la pénétration des chenilles dans les bois, qui favorisent l'installation du **BOTRYTIS**, maladie quelque peu négligée en Corse mais qui risque de se développer à la faveur d'orages de fin d'été.

En conséquence, renouvellement du traitement curatif dans les parcelles sensibles des cépages tardifs au moyen d'un spécifique, ou d'un polyvalent dans le cas de présence de cicadelles, acariens.

Exemple : SEPICLART ou KARATE - consulter le tableau du bulletin n° 9.

Pour les risques de migrations de **cochenilles**, voir le même tableau des spécialités. En situation difficile, utiliser un ULTRACIDE 20.

I S S N 07 39 - 9633
Publication Périodique CPPAP N° 1769 - AD
Abonnement Annuel : Régisseur de Recettes
Imprimerie de la Station ... Directeur-Gérant : G. FELICI

P.168

* Acariens

Demeurez vigilants et contrôler ou faites contrôler leur présence avant d'intervenir. Attention aux délais de carences avant les vendanges.

* Mildiou

Situation toujours saine dans l'ensemble, mais soyez prêts à intervenir dans les 36 heures avec un fongicide cicatrisant dans le cadre d'un orage de grêle.

* Botrytis

Appliquer le dernier traitement.

AGRUMES

* Cochenilles

Quel que soit le type de cochenilles, vérifiez leur présence dans le verger.

Intervenez suivant la nécessité avec des produits non dangereux contre les auxilliaires qui présentent beaucoup d'activité en ce moment.

Privilégier les huiles à 1 ou 2 %.

Ajouter un EKALUX au besoin mais mouiller toujours abondamment.

* Acariens

Mêmes recommandations.

* Exocortis

La prospection des symptômes se poursuit dans les vergers. Soyez coopératifs avec les techniciens de la C.A. de Haute-Corse - S.R.P.V - O.D.A.R.C. qui oeuvrent dans votre intérêt.

Signalez leur les cas douteux que vous avez observés dans vos vergers.

VERGERS A NOYAU

Repérer et marquer avec une ficelle les arbres atteints de plomb à "stéréum" de manière à les tailler en dernier lorsque le moment sera venu.

KAKI

Installer les "gobes-mouche" à cératite dans les vergers.

Pas de capture pour l'instant.

---oooOooo---